

BOLETÍN DE AFILIACIÓN A ALDA

Ruego abonen a la ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA DISTONÍA EN ARAGÓN (A.L.D.A.), con cargo a mi cuenta, los recibos correspondientes a mi aportación, por el importe y periodicidad que a continuación indico:

SOCIO DE NÚMERO

COLABORADOR

<input type="checkbox"/> Cuota mínima: 40 € Euros anuales	<input type="checkbox"/> Aportación mínima: 18 € Euros anuales
<input type="checkbox"/> Cuota voluntaria: _____ € anuales	<input type="checkbox"/> Aportación voluntaria: _____ € anuales

Banco o Caja: _____

Nº de Cuenta: _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos: _____

Fecha de nacimiento: _____

DNI.: _____

Dirección: _____

Población: _____

CP.: _____ Provincia: _____

Tel.: _____

Afectado/a : SI NO

En caso afirmativo indicar el **tipo de distonía que padece**, el **Centro Hospitalario** al que acude y el nombre del **Neurólogo** que le trata:

Patrocinado por:



GENOVEVA TORRES MORALES Nº 9 - 2º DCHA.
Tfno. 976 595 753 MÓVIL 608 037 336
50006 - ZARAGOZA
www.distoniaragon.org
info@distonia-aragon.org

SINDROME DE MEIGE



ALDA

**Asociación
de Lucha
contra
LA DISTONÍA
en Aragón**

SINDROME DE MEIGE

O DISTONÍA OROFACIAL-BUCAL

¿EN QUE CONSISTE?

Generalmente existen contracciones irregulares en un lado de la parte inferior de la cara. A veces, los músculos que actúan sobre la mandíbula lo hacen abriendo, cerrando o desviando lateralmente la boca de forma involuntaria y crónica, contrayéndose también los músculos más superficiales del cuello.

Cuando se asocia con el blefaroespasmose la conoce como Síndrome de Meige. Los síntomas normalmente empiezan entre los 40 y los 70 años y es más común en las mujeres que en los hombres.

Como el blefaroespasmose, la distonía oromandibular puede ser primaria (idiopática o hereditaria), secundaria o sintomática, debida al tratamiento con ciertos tranquilizantes durante periodos prolongados (distonía tardía), a la enfermedad de Wilson, a la enfermedad de Parkinson, etc.

“El uso de trucos sensitivos puede complementar el tratamiento médico. El chicle es una forma de mantener la boca cerrada”.

Sin duda, este conjunto de contracciones, normalmente clónicas o repetitivas, se manifiestan con muecas muy notables y molestas, lo que repercute muy desfavorablemente en el estado psicológico del paciente.. A su vez, la ansiedad, estrés, angustia, etc. aceleran o agravan los síntomas, como en el resto de las distonías. Los músculos afectados son, o pueden ser muchos: maseteros, temporales, complejo muscular submental, pterigoideo externo, y los ya citados en el caso de blefaroespasmose asociado.



TRATAMIENTO

El tratamiento sobre ser mixto o complementario, utilizando los anticolinérgicos en primer lugar, y el ensayo de cada paciente con la larga serie (Diazepam, Clonazepam, Lorazepam, Baclofeno, Carbamazepina, Pimozida, Litio, etc.) y las infiltraciones de toxina botulínica en los músculos concretos afectados, consiguiéndose buenos resultados, en parte buena totalidad de los síntomas.